


Qué esperar de una biopsia hepática percutánea

Una biopsia de hígado es un procedimiento en el que se extrae una muestra del hígado para examinarla. Ayuda a diagnosticar afecciones como cirrosis, enfermedad del hígado graso y hepatitis, determinar el estadio de una enfermedad y/o monitorear el hígado después de un trasplante.

El tipo más común de biopsia hepática es la percutánea. "Percutánea" significa "a través de la piel". El profesional de la salud inserta la aguja de biopsia directamente a través de la piel del abdomen hasta el hígado. Este método suele ser la primera opción, ya que es el menos invasivo.



¿Cómo debo prepararme para una biopsia de hígado?

Antes del procedimiento, deberá suspender ciertos medicamentos, como anticoagulantes, evitar comer o beber durante varias horas desde la noche anterior y organizar su transporte a casa después del procedimiento. Después de la biopsia, deberá descansar el resto del día y evitar actividades intensas durante 48 horas. Es normal sentir dolor o molestias durante unos días después de la biopsia.

¿Cuánto tiempo suele durar una biopsia de hígado?

Aunque el procedimiento en sí suele durar menos de 10 minutos, la visita total puede durar entre 4 y 6 horas. Esto permite la preparación previa y 2 horas de seguimiento y observación después del procedimiento.

¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse de una biopsia de hígado?

Deberá descansar en casa durante 1 o 2 días después del procedimiento. Después, podrá volver al trabajo y a la mayoría de sus actividades diarias habituales.

¿Qué tan dolorosa es una biopsia de hígado?

El médico le administrará inyecciones de lidocaína para adormecer la zona, pero con una sedación ligera. Sin embargo, no estará completamente sedado. Después de la biopsia, podría sentir algo de dolor alrededor del sitio de la biopsia o en el hombro derecho. Este dolor de hombro se denomina dolor referido y es común.